



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα

TELEFAX: 22210 36095

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Γκίκας – Κ. Θαλασσινού

ΤΗΛ 22213 53918-923

e_mail: gkikas.k@pste.gov.gr

thalassinou.k@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ ΩΣ Π.Δ
Αποστολή με e-mail

2^ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοφύτων.

Α. ΣΤΟΧΟΙ:

A1 Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

A2 Η ενημέρωση αφορά την περίοδο της καρποφορίας με καρπόδεση άνω του 50% των ανθέων και αποσκοπεί στην οργάνωση της αυτοάμυνας των βαμβακοκαλλιεργειών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

A3. Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

B1. Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο καρπόδεσης του 50% με 60% των ανθέων και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών συνεχίζεται ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης των βαμβακόφυτων.

B2. Σε γενικές γραμμές η εικόνα των βαμβακόφυτων παρουσιάζεται πολύ καλή με ικανοποιητικό δέσιμο.

B3. Όσον αφορά το **Πράσινο σκουλήκι**, οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από γεωπόνους της Υπηρεσίας μας το τελευταίο διάστημα δεν έδειξαν την παρουσία προνυμφών πράσινου.

B4. Ο αριθμός συλλήψεων ενήλικων του Ρόδινου σκουληκιού είναι μικρός και δεν έχουν παρατηρηθεί ροζέτες.

B5. Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται με νέο ζιζάνιο εισβολέα για την περιοχή το *Euphorbia heterophylla*.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνιστάται:

Γ1. Ισόρροπη λίπανση και άρδευση για αποφυγή υπερβολικής τρυφερής βλάστησης, που είναι σε βάρος των καρποφόρων οργάνων και καθιστούν τα φυτά ευπαθή στους επιβλαβείς οργανισμούς. Όπου διαπιστώνεται υπερβολική βλάστηση συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (meriquat chloride).

Γ2. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκάσμοι με εντομοκτόνα. Είναι σημαντικό μέχρι τα τέλη Αυγούστου να διαφυλαχθεί η παρουσία και η δραστηριότητα των φυσικών εχθρών διότι συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού.

Γ3. Οι παραγωγοί την περίοδο αυτή απαιτείται να **βρίσκονται σε ετοιμότητα και να παρακολουθούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους (κάθε 2-3 ημέρες) για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών** και ζημιές στην καλλιέργεια και επεμβαίνουν μόνο όταν οι πληθυσμοί ξεπερνούν τα όρια της επέμβασης όπως παρακάτω:

- **ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ:** Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη 4 προνυμφών (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής.
Επισημαίνουμε ότι αυτή η γενιά του Αυγούστου για το πράσινο σκουλήκι είναι η πιο καταστρεπτική της καλλιέργειας και τυχόν ζημιές σε καρύδια δεν αναπληρώνονται με νέα.
- **ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ :** Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο σε περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα 100 καρυδιών διαπιστωθεί προσβολή στο 5 -8 % αυτών.
Το ρόδινο σκουλήκι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι νεαρές προνύμφες διεισδύουν στα καρύδια μέσα σε 20-30 ώρες από την εκκόλαψή τους. Η προσβολή αναπτύσσεται στο εσωτερικό των καρυδιών, προκαλώντας απώλειες στην παραγωγή και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπισή της.

Δ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ.

Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων, καθώς άστοχοι και άκαιροι επιβαρύνουν την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σε κάθε περίπτωση **οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης** στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησής τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ α.α

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γεωπόνος με βαθμό Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας
Τορούτζια & Νικολαΐδη
383 34 Πεδίο Άρεως-Βόλος
2. Βαμβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας.
3. Δημοτική Ενότητα Κηρέως
Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας
4. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
5. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστοιαίας
Ιστοιαία

ΚΟΙΝ. :

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευβοίας
κ. Γ. Κελαϊδίτη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας
Κτηνοτροφίας & Αλιείας
κ. Κ. Αποστολόπουλου
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
κ. Η. Δημητρίδου



ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΧΟΡΕΣΤΙΚΟΥ