



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Μητροπόλεως 44
Ταχ.Κωδ.: 59131 Βέροια
Πληρ.: Κ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
Τηλ.: 2331350152
Email: k.bonanos@pkm.gov.gr

Βέροια : 10 Αυγούστου 2026
Αριθμός πρωτ: οικ 605075(21596)

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβakoπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2	Αφορά στο διάστημα της καρποφορίας και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβakoφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3	Απαιτείται ο βαμβakoπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβakoχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Οι βαμβakoφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας
2.2	<u>Οι συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού στις παγίδες του δικτύου είναι πολύ περιορισμένες ενώ δεν εντοπίζονται και προνύμφες κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους. Στις περιοχές του πρώην Δήμου Πλατέως και Μελίκης υπάρχουν σημαντικές συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού. Μικρός αριθμός συλλήψεων ρόδινου σημειώνεται στο αγρόκτημα Σταυρου Καβασίλων Ξεχασμένης</u>
2.3	Εντοπίζονται στις βαμβakoφυτείες προσβολές από τετράνυχτο και αλευρώδη
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
	Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβakoφυτείες τους ανά 3 ημέρες, ώστε να ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι το κατώτατο όριο επέμβασης είναι 4 προνύμφες ως ένα εκατοστό μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά ή μια προνύμφη 1 ^{ου} σταδίου στο ένα μέτρο. Στο ρόδινο σκουλήκι κατώτατο όριο επέμβασης στο στάδιο της καρποφορίας είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ(5-8) προνυμφών κ.μ.ο. στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του
4.	Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
	<u>Θα πρέπει οπωσδήποτε οι παραγωγοί άμεσα να επέμβουν, εφόσον πρώτα ελέγξουν τα αγροτεμάχια τους όπως περιγράφεται παραπάνω με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα</u> Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους, και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει πτήση των μελισσών.



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΟΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης
2. Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων – Έδρες τους
3. Δήμοι Π.Ε. Ημαθίας – Έδρες τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας – Ενταύθα
2. Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Κ. Μακεδονίας
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεν. Δ/ση Φυτικής Παραγωγής, Δ/ση Προστασίας Φυτικής παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων