



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚ. & ΦΥΤΟΪΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Μυλωνόπουλος, Κ. Γιάτσιοις
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2321355224, 2321355321
E-mail: i.mylonopoulos@pkm.gov.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ομονοίας-Τ.Κ. 62125

Σέρρες : 3 Αυγούστου 2026

Αριθμ. Πρωτ.: 585831(25188)

ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


4^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους παραγωγούς της ΠΕ Σερρών για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή της αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στη καλλιέργεια του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών και αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση της φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της φυτοπροστασίας της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργεια και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας όπως αποτυπώνονται στον σχετικό οδηγό.
1.4	Η διαφύλαξη της παρουσίας των πληθυσμών των φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού μέχρι τα τέλη Αυγούστου είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Η πλειοψηφία των βαμβακοφυτειών βρίσκονται στα βλαστικά στάδια της καρποφορίας με καρπόδεση του 10% των ανθέων (BBCH 71) στις όψιμες περιοχές έως και την καρπόδεση του 40% των ανθέων (BBCH 74) στις πρώιμες περιοχές.
2.2	Οι κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο 15ήμερο βοήθησαν στη δημιουργία και καλή ανάπτυξη των αναπαραγωγικών οργάνων του βαμβακιού.
2.3	Σύμφωνα με τα δεδομένα των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες που παρακολουθεί η υπηρεσία μας, ξεκίνησε η πτήση των ακμαίων (πεταλούδων) της 2ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού που αποτελεί την κρίσιμη γενιά για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Στην πλειοψηφία των βαμβακοφυτειών δεν διαπιστώνεται παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο επέμβασης . Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις πεταλούδων στις φερομονικές παγίδες κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.
2.4	Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας.
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1	Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να αποφεύγουν τις καλλιεργητικές πρακτικές που προάγουν τη συνεχή δημιουργία τρυφερών φυτικών ιστών, όπως η αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος προσβολής από τους επιβλαβείς οργανισμούς. Επίσης, συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένου ανασχετικού σκευάσματος σε καλλιέργειες που εμφανίζουν έντονη βλάστηση και καθυστερημένη εμφάνιση καρποφόρων οργάνων.
3.2	Καλούνται οι καλλιεργητές να επιθεωρούν τακτικά τις καλλιέργειές τους, κυρίως τις πρωινές και απογευματινές ώρες για την ύπαρξη νεαρών προνυμφών πράσινου σκουληκιού (1ου και 2ου σταδίου – μήκους περίπου 1 εκατοστού).
3.3	Πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση «προληπτικών» ψεκασμών. Το σημαντικότερο κριτήριο για την εφαρμογή ή όχι ψεκασμού για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού είναι η ηλικία και ο αριθμός των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) που εντοπίζονται στα αναπαραγωγικά όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια). Το κατώτατο όριο επέμβασης για τις προνύμφες (σκουλήκια) που εντοπίζονται στο χωράφι στο βλαστικό στάδιο της καρποφορίας είναι 4 ζωντανές νεαρές προνύμφες (σκουλήκια 1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά 1,5 μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι το σημαντικότερο κριτήριο για την εφαρμογή ή όχι ψεκασμού στο βλαστικό στάδιο της καρποφορίας, είναι η εύρεση 5-8 προνυμφών κατά μέσο όρο σε δείγμα 100 νεαρών καρυδιών που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.
4.	Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
4.1	Υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι να τηρούν πιστά τις οδηγίες χρήσης όπως αναγράφονται στην ετικέτα, να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών σε περίπτωση ψεκασμού, να διατηρούν επί τριετία τις συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων και να καταγράφουν την εφαρμογή τους στο ημερολόγιο ψεκασμών.

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού της Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμ. Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σερρών



Χρήστος Μ. Λαγούδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

1. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Αγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
2. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Σερρών (με την παράκληση να προωθηθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε.)
3. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων Π.Ε. Σερρών
4. Δήμοι Π.Ε. Σερρών (με την παράκληση να κοινοποιήσουν το δελτίο στα κατά τόπους Δημοτικά Διαμερίσματα προς ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών)

ΚΟΙΝ.:

Γενική Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ