



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚ. & ΦΥΤΟΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Μυλωνόπουλος, Κ. Γιάτσιος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2321355224, 2321355321
E-mail: i.mylonopoulos@pkm.gov.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ομονοίας-Τ.Κ. 62125

Σέρρες : 2 Σεπτεμβρίου 2026
Αριθμ. Πρωτ.: 650546(28228)

ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ

**5^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ**

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π. Φ.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους παραγωγούς της ΠΕ Σερρών για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή της αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στη καλλιέργεια του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα μέχρι το άνοιγμα του 50% των καψών και αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση της φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της φυτοπροστασίας της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργεια και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας όπως αποτυπώνονται στον σχετικό οδηγό του ΥπΑΑΤ.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Η πλειοψηφία των βαμβακοφυτειών βρίσκονται στα βλαστικά στάδια από 80% της καρπόδεσης (BBCH 78) στις όψιμες περιοχές έως το άνοιγμα του 10% των καψών (BBCH 81) στις πρώιμες περιοχές.
2.2	Σύμφωνα με τα δεδομένα των φερομονικών παγίδων που παρακολουθεί η υπηρεσία μας, οι συλλήψεις των ενηλίκων (πεταλούδων) του πράσινου σκουληκιού κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες εμφανίζουν αυξητική τάση σε ορισμένες περιοχές. Η υπηρεσία μας διενήργησε δειγματοληψίες νεαρών καρυδιών στις συγκεκριμένες περιοχές και δεν διαπιστώθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι.
2.3	Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας.
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να προσέχουν, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την συχνότητα εφαρμογής αρδεύσεων στις όψιμες φυτείες για να αποφευχθεί η εμφάνιση αναβλαστήσεων και η παραγωγή τρυφερών φυτικών ιστών που αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ρόδινο σκουλήκι.
3.2	Καλούνται οι καλλιεργητές να συνεχίσουν να επιθεωρούν τακτικά τις καλλιέργειές τους, για την ύπαρξη νεαρών προνυμφών πράσινου σκουληκιού (1ου και 2ου σταδίου – μήκους περίπου 1 εκατοστού) και να ελέγχουν δειγματοληπτικά νεαρά καρύδια για την ύπαρξη προσβολής από προνύμφες ρόδινου σκουληκιού.

