



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θεσσαλονίκη 24 Αυγούστου 2026  
Αρ. Πρωτ.: 627460 (24789)

(αποστολή με email)

Ταχ. Διεύθυνση ✉ : 26ης Οκτωβρίου 64  
54627 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες ✉ : Αν. Βαϊτσόπουλος  
Βασ.Τασίνας  
Τηλέφωνο ☎ : 2313 330417  
2313 330351  
e-mail : [A.Vaitsopoulos@pkm.gov.gr](mailto:A.Vaitsopoulos@pkm.gov.gr)  
[V.Tasinas@pkm.gov.gr](mailto:V.Tasinas@pkm.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

5ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Στόχοι

- 1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Δ.Α.Ο.Α της Π.Ε. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και απευθύνεται στους βαμβakoπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2 Αφορά το καλλιεργητικό διάστημα από το βλαστικό στάδιο του ανοίγματος των πρώτων καρυδιών μέχρι την έναρξη του επόμενου σταδίου, αυτό του ανοίγματος του 50% των καρυδιών.
- 1.3 Ο βαμβakoπαραγωγός **απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβakoχώρο** και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις

- 2.1 Οι βαμβakoφυτείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης «Άνοιγμα των πρώτων καρυδιών».
- 2.2 Την περίοδο αυτή οι συλλήψεις ενηλίκων του πράσινου σκουληκιού κυμαίνονται σε χαμηλό επίπεδο σε όλες τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις οποίες εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες, ενώ του ρόδινου σκουληκιού παρουσιάζουν διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή.
- 2.3 Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες **δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης, αλλά οι παραγωγοί πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να ελέγχουν τα χωράφια τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα.** Ειδικά στην περιοχή της **Επανομής** συνίσταται στους παραγωγούς να προβαίνουν σε συχνότερες (ανά δύο ημέρες) δειγματοληψίες 100 καρυδιών από τα χωράφια τους και **αν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών προνύμφες ρόδινου σκουληκιού σε ποσοστό 5% και άνω να προβούν σε ψεκασμούς με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.** Από τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι διαπιστώθηκαν σημαντικοί πληθυσμοί από αλευρώδεις στις δυτικές κυρίως περιοχές της Περιφερειακής μας Ενότητας.

### 3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Είναι **απαραίτητο** να συνεχίζεται η παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών ανά τρεις τουλάχιστον (3) ημέρες τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.

Το κατώτατο όριο επέμβασης είναι:

- i. **τέσσερις (4) προνύμφες πράσινου σκουληκιού** 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κ.μ.ο. ή χρηστικά **μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση (1,5) μέτρου επί της γραμμής** κ.μ.ο.,
- ii. **πέντε έως οκτώ (5-8) προνύμφες ροδίνου σκουληκιού** κ.μ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.

3.2 Οι παραγωγοί θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική άρδευση διότι αυτή οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου προσβολής .

### 4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί διαπιστώσουν στις δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι **υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη παράγραφο 3.1, μόνο τότε** να προβούν σε ψεκασμό με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Συστήνονται κατά προτεραιότητα :

1. Τα βιολογικά εντομοκτόνα
2. Τα χημικά εκλεκτικά εντομοκτόνα
3. Τα χημικά εντομοκτόνα μη εκλεκτικά

Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων, συνιστάται να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μόνο στις περιπτώσεις που οι προσβολές υπερβούν τα παραπάνω όρια (παράγραφος 3.1). Σε κάθε περίπτωση δεν συνιστώνται άσκοποι και άκαιροι ψεκασμοί διότι αποβαίνουν εις βάρος της καλλιέργειας ως προς την παραγωγικότητα και την οικονομικότητα καθώς επίσης και εις βάρος του περιβάλλοντος και την ανθρώπινης υγείας. Όταν προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων **συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας** για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Προσοχή:

- Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους ανωτέρω εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
- Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
- Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Σαρόπουλος Αθανάσιος**